

Impfplan für Kaninchen

1. Impfung mit 4 Wochen: RHD, RHD 2 und Myxomatose

2. Impfung mit 7 Wochen: RHD, RHD 2 und Myxomatose

Auffrischungsimpfungen gegen RHD, RHD 2 und Myxomatose sind halbjährlich notwendig.

RHD und RHD2 kann auch ohne Myxomatose geimpft werden. Der Impfplan gestaltet sich gleich.

RHD und RHD 2

Übertragungswege:

über direkten Kontakt zu infizierten Kaninchen, blutsaugende Insekten wie z.B. Mücken oder Flöhe, Futter, das mit infizierten Kaninchen in Kontakt war

Symptome:

perakute Verläufe mit Gerinnungsstörungen, Fieber und blutigen Ausflüssen, Tod tritt in den meisten Fällen innerhalb von Tagen ein, überlebende Tiere weisen einen chronischen Verlauf auf und können die Erreger weiterhin ausscheiden

Myxomatose

Übertragungswege:

über direkten Kontakt zu infizierten Kaninchen, blutsaugende Insekten wie z.B. Mücken oder Flöhe, Futter, das mit infizierten Kaninchen in Kontakt war

Symptome:

Apathie, Fressunlust, Schwellungen am Kopf und im Genitalbereich, ein Großteil der Kaninchen stirbt innerhalb von Tagen, überlebende Kaninchen weisen chronische Verläufe mit Pustelbildung auf